



# Leptospirosis

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 4651 ราย จาก 72 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 7.03 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 45 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.07 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.26 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (18.43 %) >65 ปี (17.65 %) 55-64 ปี (16.96 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.9 พม่าร้อยละ 1.8 อื่นๆร้อยละ 1.0 ลาวร้อยละ 0.3 กัมพูชาร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 42.7 รับจ้างร้อยละ 22.3 นักเรียนร้อยละ 13.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสาคร ปทุมธานี สิงห์บุรี นครนายก พิจิตร ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (43 ราย), 35-44 ปี (36 ราย), 45-54 ปี (33 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (403 ราย), 55-64 ปี (372 ราย), >65 ปี (332 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (201 ราย), 55-64 ปี (156 ราย), 45-54 ปี (112 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (384 ราย), 45-54 ปี (309 ราย), 25-34 ปี (299 ราย),



Number of Leptospirosis cases by week of onset and region.

2566

