

Mushroom poisoning


d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 2557 ราย จาก 66 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 3.86 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 11 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.89 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (25.62 %) 55-64 ปี (23.58 %) 45-54 ปี (20.49 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.4 อื่นๆร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.5 พม่าร้อยละ 0.4 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 38.1 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 28.0 รับจ้างร้อยละ 17.8

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (48 ราย), 35-44 ปี (44 ราย), 55-64 ปี (40 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (575 ราย), 55-64 ปี (487 ราย), 45-54 ปี (405 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (64 ราย), 45-54 ปี (53 ราย), >65 ปี (46 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (18 ราย), 25-34 ปี (16 ราย), 35-44 ปี (15 ราย),



Number of Mushroom poisoning cases by week of onset and region

