

Filariasis



d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 71 ราย จาก 7 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.11 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.73 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (38.03 %) 0-4 ปี (21.13 %) 55-64 ปี (11.27 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.8 พม่าร้อยละ 2.8 ลาวร้อยละ 1.4 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 52.1 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 26.8 รับจ้างร้อยละ 12.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (24 ราย), 55-64 ปี (6 ราย), 1 ปี (6 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (1 ราย), 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (3 ราย), 55-64 ปี (2 ราย), 45-54 ปี (1 ราย),



Number of Filariasis cases by week of onset and region.

