


Condyloma Acuminata

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 5156 ราย จาก 75 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 7.79 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.69 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (45.23 %) 25-34 ปี (23.37 %) 35-44 ปี (12.18 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.4 อื่นๆร้อยละ 3.8 พม่าร้อยละ 1.5 ลาวร้อยละ 0.8 กัมพูชาร้อยละ 0.4 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 30.6 ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 27.4 นักเรียนร้อยละ 26.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดระนอง นราธิวาส ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (726 ราย), 25-34 ปี (546 ราย), 35-44 ปี (320 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (771 ราย), 25-34 ปี (302 ราย), 35-44 ปี (144 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (616 ราย), 25-34 ปี (232 ราย), 35-44 ปี (94 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (219 ราย), 25-34 ปี (125 ราย), 35-44 ปี (70 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of Condyloma Acuminata cases by week of onset and regio

2566

