

Other STI

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 5687 ราย จาก 71 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 8.59 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 18.54 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (24.56 %) 35-44 ปี (22.24 %) 15-24 ปี (19.62 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 92.7 อื่นๆร้อยละ 2.7 พม่าร้อยละ 2.2 กัมพูชา r้อยละ 1.3 ลาว r้อยละ 1.0 มาเลเซีย r้อยละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 35.5 ไม่ทราบอาชีพในปักษ์คงร้อยละ 24.8 เกษตรร้อยละ 14.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม อ่างทอง นครนายก ระนอง อำนาจเจริญ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พbmagaในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (578 ราย), 35-44 ปี (514 ราย), 15-24 ปี (368 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (399 ราย), 35-44 ปี (369 ราย), 25-34 ปี (362 ราย),
- ภาคเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (346 ราย), 25-34 ปี (344 ราย), 35-44 ปี (293 ราย),
- ภาคใต้ พbmagaในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (113 ราย), 35-44 ปี (89 ราย), 15-24 ปี (74 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Other STI cases by week of onset and region.

2566

