


## Other STI

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 5623 ราย จาก 71 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 8.50 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 18.59 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (24.56 %) 35-44 ปี (22.16 %) 15-24 ปี (19.74 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 92.7 อื่นๆร้อยละ 2.8 พม่าร้อยละ 2.1 กัมพูชาร้อยละ 1.4 ลาวร้อยละ 1.0 มาเลเซียร้อยละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 35.5 ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 24.6 เกษตรร้อยละ 14.8


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อ่างทอง นครนายก ระนอง อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (571 ราย), 35-44 ปี (504 ราย), 15-24 ปี (368 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (399 ราย), 35-44 ปี (367 ราย), 25-34 ปี (359 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (341 ราย), 15-24 ปี (341 ราย), 35-44 ปี (288 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (110 ราย), 35-44 ปี (87 ราย), 15-24 ปี (74 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Other STI cases by week of onset and region.  
2566

