

Chikungunya

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Chikungunya พบผู้ป่วย 259 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 25 กพ 66 จาก 15 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.39 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.78 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 35-44 ปี (23.94 %) 45-54 ปี (23.17 %) 55-64 ปี (16.60 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 73.7 อื่น ร้อยละ 25.1 กัมพูชาร้อยละ 0.8 พม่าร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 56.0 รับจ้างร้อยละ 17.8 ค้าขายร้อยละ 7.7


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (56 ราย), 35-44 ปี (56 ราย), 55-64 ปี (42 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (3 ราย), 15-24 ปี (2 ราย), 45-54 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (3 ราย), 35-44 ปี (1 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (5 ราย), 15-24 ปี (1 ราย), 2 ปี (1 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of Chikungunya cases by week of onset and region.
2566

