

Chikungunya


d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 1506 ราย จาก 53 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.28 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.26 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (19.59 %) 35-44 ปี (18.53 %) 55-64 ปี (16.14 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 91.4 อื่นๆร้อยละ 7.6 พม่าร้อยละ 0.6 กัมพูชาร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 34.3 รับจ้างร้อยละ 26.3 เกษตรร้อยละ 12.9


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (172 ราย), 35-44 ปี (169 ราย), 55-64 ปี (135 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (52 ราย), 55-64 ปี (50 ราย), 25-34 ปี (47 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (63 ราย), 55-64 ปี (57 ราย), 35-44 ปี (49 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (27 ราย), 35-44 ปี (24 ราย), 15-24 ปี (15 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of Chikungunya cases by week of onset and region.

2566

