

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Vaginal trichomoniasis

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค **Vaginal trichomoniasis** พบผู้ป่วย 44 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 16 มีค 66 จาก 18 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.07 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 21.00 กลุ่มอายุ ที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (27.27 %) 25-34 ปี (27.27 %) 35-44 ปี (15.91 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.5 ลาวร้อยละ 2.3 อื่น ร้อยละ 2.3 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 31.8 รับจ้างร้อยละ 29.5 เกษตรร้อยละ 15.9


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (8 ราย), 15-24 ปี (7 ราย), 45-54 ปี (4 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (2 ราย), 15-24 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (2 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3 ราย), 25-34 ปี (2 ราย), 55-64 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (1 ราย), 25-34 ปี (1 ราย),




อัตราต่อแสนประชากร



Number of Vaginal trichomoniasis cases by week of onset and regio

2566



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health