

## Vaginal trichomoniasis

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 178 ราย จาก 28 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.27 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 16.80 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (26.97 %) 25-34 ปี (24.16 %) 45-54 ปี (17.42 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.3 พม่าร้อยละ 3.4 อื่นๆร้อยละ 2.8 ลาวร้อยละ 0.6 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 35.4 ไม่ทราบอาชีพ/ในปักครองร้อยละ 30.3 เกษตรร้อยละ 12.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบรากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (28 ราย), 15-24 ปี (25 ราย), 45-54 ปี (14 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบรากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (9 ราย), 45-54 ปี (7 ราย), 35-44 ปี (5 ราย),
- ภาคเหนือ พบรากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (11 ราย), 55-64 ปี (8 ราย), 45-54 ปี (7 ราย),
- ภาคใต้ พบรากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (5 ราย), 45-54 ปี (3 ราย), 15-24 ปี (3 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0.01-0.20	<input type="checkbox"/> 0.21-0.40
<input type="checkbox"/> 0.41-0.60	<input type="checkbox"/> 0.61-0.80	<input type="checkbox"/> 0.81-1

Number of Vaginal trichomoniasis cases by week of onset and region 2566

