

Zika virus


d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Zika virus พบผู้ป่วย 668 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 24 พย 66 จาก 35 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.38 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (22.46 %) 35-44 ปี (21.71 %) 45-54 ปี (16.02 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.9 อื่นๆร้อยละ 1.9 พม่าร้อยละ 0.4 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 23.5 รับจ้างร้อยละ 19.3 นักเรียนร้อยละ 14.7


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (100 ราย), 35-44 ปี (84 ราย), 45-54 ปี (64 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 0-27 วัน (10 ราย), 25-34 ปี (7 ราย), 10-14 ปี (7 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (51 ราย), 25-34 ปี (42 ราย), 45-54 ปี (41 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (5 ราย), 55-64 ปี (1 ราย), 25-34 ปี (1 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of Zika virus cases by week of onset and region.
2566

