

Zika virus


d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 758 ราย จาก 36 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.15 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.41 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (23.22 %) 35-44 ปี (22.03 %) 45-54 ปี (16.09 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.9 อื่นๆร้อยละ 3.0 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.4 พม่าร้อยละ 0.4 กัมพูชาร้อยละ 0.1 ลาวร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 25.5 รับจ้างร้อยละ 20.6 นักเรียนร้อยละ 13.3


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (124 ราย), 35-44 ปี (103 ราย), 45-54 ปี (79 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 0-27 วัน (11 ราย), 10-14 ปี (8 ราย), 25-34 ปี (7 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (52 ราย), 25-34 ปี (44 ราย), 15-24 ปี (42 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (7 ราย), 55-64 ปี (1 ราย), 15-24 ปี (1 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of Zika virus cases by week of onset and region.

2566

