

Zika virus

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 835 ราย จาก 36 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.26 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.33 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (23.11 %) 35-44 ปี (22.63 %) 45-54 ปี (15.93 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.5 อื่นๆร้อยละ 4.6 พม่าร้อยละ 0.4 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.4 กัมพูชา r้อยละ 0.1 ลาว r้อยละ 0.1 อาเซียนส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปักตรองร้อยละ 28.1 รับจ้างร้อยละ 20.2 นักเรียนร้อยละ 13.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (133 ราย), 35-44 ปี (118 ราย), 45-54 ปี (89 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (15 ราย), 0-27 วัน (12 ราย), 35-44 ปี (12 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (52 ราย), 25-34 ปี (44 ราย), 15-24 ปี (42 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (7 ราย), 55-64 ปี (1 ราย), 25-34 ปี (1 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.01-0.20	<input type="checkbox"/> 0.21-0.40
<input type="checkbox"/> 0.41-0.60	<input checked="" type="checkbox"/> 0.61-0.80	<input type="checkbox"/> 0.81-1

Number of Zika virus cases by week of onset and region.

2566

