Diarrhoea

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Diarrhoea พบผู้ป่วย 17270 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 25 มีค 67 จาก 2 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 26.10 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.35 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (22.59 %) 0-4 ปี (15.22 %) 35-44 ปี (15.08 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 91.8 อื่นๆร้อยละ 5.8 พม่าร้อยละ 1.2 ลาวร้อยละ 0.5 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.4 กัมพูชาร้อยละ 0.2 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 71.0 รับจ้างร้อยละ 13.7 นักเรียนร้อยละ 11.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (3902 ราย), 35-44 ปี (2604 ราย), 15-24 ปี (1829 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ

This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

□0

Number of Diarrhoea cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health