

Typhoid


d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Typhoid พบผู้ป่วย 498 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 16 เมย 67 จาก 54 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.75 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.29 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (22.09 %) >65 ปี (20.48 %) 55-64 ปี (16.06 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.2 พม่าร้อยละ 1.2 ลาวร้อยละ 0.4 อื่นๆร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 30.3 รับจ้างร้อยละ 21.3 เกษตรร้อยละ 16.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (13 ราย), 25-34 ปี (8 ราย), 55-64 ปี (6 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (25 ราย), >65 ปี (17 ราย), 55-64 ปี (15 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (25 ราย), 45-54 ปี (22 ราย), 55-64 ปี (16 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (55 ราย), 45-54 ปี (50 ราย), 55-64 ปี (43 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Typhoid cases by week of onset and region.
2567

