

Typhoid

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Typhoid พบผู้ป่วย 807 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 24 มิย 67 จาก 59 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.22 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.27 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (22.55 %) 45-54 ปี (19.95 %) 55-64 ปี (16.23 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.5 พม่าร้อยละ 0.9 ลาวร้อยละ 0.4 อื่นๆร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 33.8 รับจ้างร้อยละ 21.6 เกษตรร้อยละ 15.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (16 ราย), 25-34 ปี (11 ราย), 55-64 ปี (9 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (42 ราย), >65 ปี (32 ราย), 55-64 ปี (29 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (40 ราย), 55-64 ปี (28 ราย), 45-54 ปี (27 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (104 ราย), 45-54 ปี (76 ราย), 55-64 ปี (65 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Typhoid cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health