

# Typhoid

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Typhoid พบผู้ป่วย 985 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 22 กค 67 จาก 60 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.49 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.29 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (21.52 %) 45-54 ปี (19.19 %) 55-64 ปี (16.14 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.5 พม่าร้อยละ 0.9 ลาวร้อยละ 0.3 อื่นๆร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 33.6 รับจ้างร้อยละ 21.1 เกษตรร้อยละ 14.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ  
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (14 ราย), 35-44 ปี (12 ราย), 25-34 ปี (11 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (52 ราย), 55-64 ปี (48 ราย), >65 ปี (41 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (41 ราย), 45-54 ปี (32 ราย), 55-64 ปี (29 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (124 ราย), 45-54 ปี (91 ราย), 55-64 ปี (74 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Typhoid cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health