

Typhoid

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Typhoid พบผู้ป่วย 1797 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 ธค 67 จาก 66 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.72 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.20 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (21.26 %) 45-54 ปี (19.25 %) 55-64 ปี (15.97 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.9 พม่าร้อยละ 0.9 อื่นๆร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.5 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 32.9 รับจ้างร้อยละ 21.8 เกษตรร้อยละ 13.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (22 ราย), 35-44 ปี (18 ราย), 25-34 ปี (15 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (103 ราย), >65 ปี (93 ราย), 55-64 ปี (73 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (79 ราย), 45-54 ปี (59 ราย), 55-64 ปี (57 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (202 ราย), 45-54 ปี (162 ราย), 55-64 ปี (143 ราย),

ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Typhoid cases by week of onset and region.

2567

