

## Paratyphoid

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Paratyphoid พบผู้ป่วย 167 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 14 พย 67 จาก 32 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.25 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.11 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (22.16 %) >65 ปี (19.16 %) 25-34 ปี (13.77 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 99.4 อื่นๆ ร้อยละ 0.6 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 37.7 รับจ้างร้อยละ 19.2 นักเรียนร้อยละ 12.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (8 ราย), 45-54 ปี (5 ราย), >65 ปี (4 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (9 ราย), 55-64 ปี (8 ราย), >65 ปี (6 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (6 ราย), 35-44 ปี (5 ราย), 45-54 ปี (4 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (19 ราย), >65 ปี (16 ราย), 35-44 ปี (13 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Paratyphoid cases by week of onset and region.  
2567

