

Pertussis

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Pertussis พบผู้ป่วย 613 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 5 เมย 67 จาก 12 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.93 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.00 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (70.80 %) 7-9 ปี (8.81 %) 10-14 ปี (4.73 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.9 อื่นๆร้อยละ 0.8 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 พม่าร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 78.0 นักเรียนร้อยละ 18.4 รับจ้างร้อยละ 1.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 1-3 เดือน (2 ราย), 55-64 ปี (1 ราย), 9-11 เดือน (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (2 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 4-5 เดือน (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (97 ราย), 6-8 เดือน (62 ราย), 9-11 เดือน (58 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□0

Number of Pertussis cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health