

Pertussis

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Pertussis พบผู้ป่วย 1036 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 20 กค 67 จาก 16 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.57 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.05 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (72.49 %) 7-9 ปี (6.66 %) 10-14 ปี (4.54 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.6 อื่นๆร้อยละ 0.7 พม่าร้อยละ 0.5 ลาวร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 80.5 นักเรียนร้อยละ 16.3 รับจ้างร้อยละ 1.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (6 ราย), 7-9 ปี (3 ราย), 2 ปี (3 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (2 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 4-5 เดือน (2 ราย), 1-3 เดือน (2 ราย), 5 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (189 ราย), 6-8 เดือน (102 ราย), 2 ปี (95 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Pertussis cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health