

Pertussis

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Pertussis พบผู้ป่วย 1214 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 24 พย 67 จาก 25 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.83 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.05 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (69.36 %) 7-9 ปี (6.51 %) 10-14 ปี (5.19 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.1 อื่นๆร้อยละ 1.1 พม่าร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 79.8 นักเรียนร้อยละ 16.6 รับจ้างร้อยละ 1.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (18 ราย), 10-14 ปี (17 ราย), >65 ปี (8 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (2 ราย), 25-34 ปี (1 ราย), >65 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (3 ราย), 1-3 เดือน (2 ราย), 4-5 เดือน (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (215 ราย), 6-8 เดือน (111 ราย), 2 ปี (105 ราย),

ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Pertussis cases by week of onset and region.

2567

