

## D.H.F.shock syndrome


d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 201 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 20 เมย 67 จาก 52 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.30 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 12 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.18 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (27.86 %) 10-14 ปี (15.92 %) 25-34 ปี (15.42 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.5 พม่าร้อยละ 1.5 อื่นๆร้อยละ 1.0 ลาวร้อยละ 0.5 กัมพูชาร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 35.8 นักเรียนร้อยละ 33.3 รับจ้างร้อยละ 15.9

จังหวัดที่มีอัตรารายต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตรารายสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (16 ราย), 10-14 ปี (15 ราย), 25-34 ปี (14 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (11 ราย), 10-14 ปี (8 ราย), 45-54 ปี (5 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (6 ราย), 25-34 ปี (6 ราย), 35-44 ปี (3 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (23 ราย), 25-34 ปี (8 ราย), 10-14 ปี (7 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio  
2567

