

# D.H.F.shock syndrome

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 297 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 22 มิย 67 จาก 61 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.45 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 23 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.03 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.02 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (27.27 %) 25-34 ปี (15.49 %) 10-14 ปี (14.14 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.3 อื่นๆร้อยละ 1.7 พม่าร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.3 กัมพูชาร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 36.4 นักเรียนร้อยละ 31.6 รับจ้างร้อยละ 17.2


จังหวัดที่มีอัตรารายต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตรารายสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (18 ราย), 15-24 ปี (18 ราย), 25-34 ปี (18 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (19 ราย), 45-54 ปี (9 ราย), 10-14 ปี (8 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (16 ราย), 25-34 ปี (16 ราย), 35-44 ปี (7 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (28 ราย), 10-14 ปี (12 ราย), 35-44 ปี (10 ราย),



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health