

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักงำนบดีวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.shock syndrome

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 400 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 22 กค 67 จาก 63 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.60 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 25 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.04 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.96 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (30.75 %) 25-34 ปี (14.75 %) 10-14 ปี (14.00 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.8 พม่าร้อยละ 2.5 อื่นๆร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 1.3 เวียดนามร้อยละ 0.3 อาชีพ ส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 34.5 ไม่ทราบอาชีพ/ในปักษ่องร้อยละ 33.8 รับจ้างร้อยละ 17.8

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (21 ราย), 25-34 ปี (20 ราย), 10-14 ปี (19 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (27 ราย), 10-14 ปี (12 ราย), 7-9 ปี (9 ราย),
- ภาคเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (34 ราย), 25-34 ปี (25 ราย), 35-44 ปี (19 ราย),
- ภาคใต้ พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (41 ราย), 10-14 ปี (16 ราย), 35-44 ปี (12 ราย),




ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

0

Number of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and region

2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health