

D.H.F.shock syndrome

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 822 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 17 พย 67 จาก 70 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.24 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 52 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.08 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.88 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (28.83 %) 10-14 ปี (16.06 %) 25-34 ปี (14.96 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.3 พม่าร้อยละ 2.8 อื่นๆร้อยละ 1.1 ลาวร้อยละ 1.0 กัมพูชาร้อยละ 0.6 เวียดนามร้อยละ 0.1 จีนฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 36.5 ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 30.4 รับจ้างร้อยละ 19.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง แพร่ สกลนคร พังงา กระบี่ สตูล ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (34 ราย), 10-14 ปี (30 ราย), 25-34 ปี (29 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (45 ราย), 10-14 ปี (42 ราย), 25-34 ปี (24 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (64 ราย), 25-34 ปี (32 ราย), 35-44 ปี (28 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (94 ราย), 10-14 ปี (47 ราย), 25-34 ปี (38 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□0

umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2567

