

STI Total

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค พบผู้ป่วย 60380 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 18 พย 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 91.25 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 8 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.58 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (40.69 %) 25-34 ปี (28.08 %) 35-44 ปี (12.46 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.0 พม่าร้อยละ 2.6 อื่นๆร้อยละ 2.2 กัมพูชาร้อยละ 1.0 ลาวร้อยละ 1.0 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 47.4 รับจ้างร้อยละ 24.0 นักเรียนร้อยละ 14.9 อื่นๆร้อยละ 2.9 เกษตรร้อยละ 2.8 ข้าราชการร้อยละ 2.7 งานบ้านร้อยละ 2.1 ทหารร้อยละ 1.4 ค้าขายร้อยละ 0.9 อาชีพพิเศษSTIร้อยละ 0.6 ครูร้อยละ 0.4 ประมงร้อยละ 0.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 0.0 นักบวชร้อยละ 0.0 เลี้ยงสัตว์ร้อยละ 0.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (10553 ราย), 25-34 ปี (9006 ราย), 35-44 ปี (4206 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (7457 ราย), 25-34 ปี (3691 ราย), 35-44 ปี (1306 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3918 ราย), 25-34 ปี (1936 ราย), 35-44 ปี (792 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2640 ราย), 25-34 ปี (2323 ราย), 35-44 ปี (1222 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of cases by week of onset and region.
2567

