

Syphilis

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Syphilis พบผู้ป่วย 14407 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 กค 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 21.77 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.59 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (37.34 %) 25-34 ปี (32.07 %) 35-44 ปี (12.80 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 91.4 พม่าร้อยละ 4.6 กัมพูชาร้อยละ 2.1 ลาวร้อยละ 1.2 อื่นๆร้อยละ 0.6 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 44.3 รับจ้างร้อยละ 30.4 นักเรียนร้อยละ 12.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2387 ราย), 25-34 ปี (2339 ราย), 35-44 ปี (944 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1826 ราย), 25-34 ปี (1187 ราย), 35-44 ปี (402 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (746 ราย), 25-34 ปี (586 ราย), 35-44 ปี (214 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (509 ราย), 15-24 ปี (421 ราย), 35-44 ปี (284 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร 0

Number of Syphilis cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health