

## Gonorrhoea

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Gonorrhoea พบผู้ป่วย 8690 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 กค 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 13.13 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.15 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (58.60 %) 25-34 ปี (24.29 %) 35-44 ปี (8.27 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.3 พบาร้อยละ 1.8 อื่นๆร้อยละ 1.5 ลาวร้อยละ 0.7 กัมพูชาร้อยละ 0.5 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 41.2 นักเรียนร้อยละ 22.8 รับจ้างร้อยละ 20.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1823 ราย), 25-34 ปี (1102 ราย), 35-44 ปี (395 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1763 ราย), 25-34 ปี (504 ราย), 35-44 ปี (156 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1007 ราย), 25-34 ปี (252 ราย), 35-44 ปี (76 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (499 ราย), 25-34 ปี (253 ราย), 35-44 ปี (92 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□0

Number of Gonorrhoea cases by week of onset and region.

2567

