

# Gonorrhoea

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Gonorrhoea พบผู้ป่วย 14170 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 18 พย 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 21.41 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.15 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (58.28 %) 25-34 ปี (24.50 %) 35-44 ปี (8.44 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.3 พม่าร้อยละ 2.0 อื่นๆร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.6 กัมพูชาร้อยละ 0.5 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 40.6 นักเรียนร้อยละ 23.0 รับจ้างร้อยละ 21.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3023 ราย), 25-34 ปี (1769 ราย), 35-44 ปี (655 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2789 ราย), 25-34 ปี (859 ราย), 35-44 ปี (254 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1563 ราย), 25-34 ปี (435 ราย), 35-44 ปี (137 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (883 ราย), 25-34 ปี (408 ราย), 35-44 ปี (150 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Gonorrhoea cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health