

Leptospirosis

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Leptospirosis พบผู้ป่วย 787 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 6 เมย 67 จาก 48 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.19 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 7 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.29 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (19.31 %) 45-54 ปี (18.81 %) >65 ปี (17.92 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.0 พม่าร้อยละ 2.3 ลาวร้อยละ 0.8 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 32.1 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 27.3 รับจ้างร้อยละ 17.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (9 ราย), 25-34 ปี (6 ราย), 55-64 ปี (5 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (62 ราย), 45-54 ปี (56 ราย), 55-64 ปี (55 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (32 ราย), >65 ปี (24 ราย), 45-54 ปี (16 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (71 ราย), 45-54 ปี (67 ราย), 25-34 ปี (64 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□0

Number of Leptospirosis cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health