

Leptospirosis

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Leptospirosis พบผู้ป่วย 888 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 21 เมย 67 จาก 53 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.34 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 8 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.27 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (19.82 %) >65 ปี (18.58 %) 55-64 ปี (18.58 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.0 พม่าร้อยละ 2.4 ลาวร้อยละ 0.7 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 33.3 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 27.0 รับจ้างร้อยละ 16.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (10 ราย), 55-64 ปี (7 ราย), 25-34 ปี (7 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (74 ราย), 45-54 ปี (67 ราย), 55-64 ปี (62 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (34 ราย), >65 ปี (30 ราย), 45-54 ปี (24 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (77 ราย), 45-54 ปี (75 ราย), 25-34 ปี (71 ราย),



This plugin is not supported

อัตราต่อแสนประชากร

□0

Number of Leptospirosis cases by week of onset and region.
2567

