

Leptospirosis

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Leptospirosis พบผู้ป่วย 1458 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 มิย 67 จาก 66 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.20 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 17 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.03 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.27 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (20.44 %) 55-64 ปี (19.55 %) >65 ปี (18.45 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.1 พม่าร้อยละ 2.1 ลาวร้อยละ 0.5 อื่นๆร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 33.5 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 26.7 รับจ้างร้อยละ 17.1

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (15 ราย), 55-64 ปี (10 ราย), 35-44 ปี (9 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (122 ราย), 45-54 ปี (117 ราย), 55-64 ปี (111 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (65 ราย), >65 ปี (59 ราย), 45-54 ปี (41 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (125 ราย), 25-34 ปี (106 ราย), 35-44 ปี (105 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Leptospirosis cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health