

# Leptospirosis

d50667


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Leptospirosis พบผู้ป่วย 3752 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 17 พย 67 จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 5.67 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 39 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.06 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.28 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (19.88 %) 45-54 ปี (19.22 %) >65 ปี (18.66 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.7 พม่าร้อยละ 2.2 ลาวร้อยละ 0.6 กัมพูชาร้อยละ 0.2 อื่นๆร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 33.4 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 24.8 รับจ้างร้อยละ 20.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ตราด ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (36 ราย), 45-54 ปี (30 ราย), 25-34 ปี (23 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (316 ราย), 45-54 ปี (305 ราย), >65 ปี (271 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (229 ราย), 55-64 ปี (200 ราย), 45-54 ปี (149 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (254 ราย), 25-34 ปี (240 ราย), 45-54 ปี (237 ราย),



Number of Leptospirosis cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health