

Liver fluke

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Liver fluke พบผู้ป่วย 1009 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 21 มิย 67 จาก 28 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.52 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.04 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (36.47 %) 45-54 ปี (25.07 %) >65 ปี (23.49 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 99.8 ลาวร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 40.3 รับจ้างร้อยละ 20.8 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 20.1

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (3 ราย), 45-54 ปี (2 ราย), >65 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (278 ราย), 45-54 ปี (208 ราย), >65 ปี (161 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (87 ราย), >65 ปี (75 ราย), 45-54 ปี (43 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Liver fluke cases by week of onset and region.
2567

