

Liver fluke

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Liver fluke พบผู้ป่วย 2353 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 8 พย 67 จาก 31 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 3.56 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.33 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (38.04 %) 45-54 ปี (25.80 %) >65 ปี (23.67 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 99.8 ลาวร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 38.5 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 30.8 รับจ้างร้อยละ 16.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (3 ราย), 45-54 ปี (2 ราย), >65 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (692 ราย), 45-54 ปี (508 ราย), >65 ปี (401 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (200 ราย), >65 ปี (155 ราย), 45-54 ปี (97 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Liver fluke cases by week of onset and region.
2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health