

## Condyloma Acuminata

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Condyloma Acuminata พบผู้ป่วย 1838 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 25 มีค 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.78 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.88 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (46.68 %) 25-34 ปี (25.30 %) 35-44 ปี (13.06 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.3 อื่นๆร้อยละ 3.0 พม่าร้อยละ 1.5 ลาวร้อยละ 0.7 กัมพูชาร้อยละ 0.3 จีน/ฮ่องกง/ได้หัวน้ำร้อยละ 0.2 เวียดนามร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในประกอบร้อยละ 47.2 รับจ้างร้อยละ 21.5 นักเรียนร้อยละ 16.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พbmagaikในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (370 ราย), 25-34 ปี (252 ราย), 35-44 ปี (137 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พbmagaikในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (233 ราย), 25-34 ปี (82 ราย), 35-44 ปี (38 ราย),
- ภาคเหนือ พbmagaikในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (151 ราย), 25-34 ปี (50 ราย), 35-44 ปี (28 ราย),
- ภาคใต้ พbmagaikในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (104 ราย), 25-34 ปี (81 ราย), 35-44 ปี (37 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

0

Lumber of Condyloma Acuminata cases by week of onset and regio

2567

