

Condyloma Acuminata

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Condyloma Acuminata พบผู้ป่วย 2312 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 16 เมย 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 3.49 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1:1.95 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (46.37 %) 25-34 ปี (24.96 %) 35-44 ปี (13.37 %) สัญชาติเป็นไทย ร้อยละ 94.4 อื่นๆร้อยละ 2.9 พม่าร้อยละ 1.4 ลาวร้อยละ 0.7 กัมพูชาร้อยละ 0.3 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 เวียดนามร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 47.8 รับจ้างร้อยละ 21.6 นักเรียนร้อยละ 16.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (459 ราย), 25-34 ปี (313 ราย), 35-44 ปี (178 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (292 ราย), 25-34 ปี (98 ราย), 35-44 ปี (43 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (181 ราย), 25-34 ปี (66 ราย), 35-44 ปี (35 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (140 ราย), 25-34 ปี (100 ราย), 35-44 ปี (53 ราย),



This plugin is not supported

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

lumber of Condyloma Acuminata cases by week of onset and regio
2567

