

# Condyloma Acuminata

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Condyloma Acuminata พบผู้ป่วย 4182 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 24 มิย 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 6.32 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.79 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (44.72 %) 25-34 ปี (26.59 %) 35-44 ปี (13.68 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.5 อื่นๆร้อยละ 2.9 พม่าร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.9 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 กัมพูชาร้อยละ 0.2 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 52.2 รับจ้างร้อยละ 19.8 นักเรียนร้อยละ 14.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (847 ราย), 25-34 ปี (619 ราย), 35-44 ปี (333 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (480 ราย), 25-34 ปี (166 ราย), 35-44 ปี (72 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (331 ราย), 25-34 ปี (150 ราย), 35-44 ปี (74 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (212 ราย), 25-34 ปี (177 ราย), 35-44 ปี (93 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

lumber of Condyloma Acuminata cases by week of onset and regio 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health