

## Condyloma Acuminata

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Condyloma Acuminata พบผู้ป่วย 4997 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 22 กค 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 7.55 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.71 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (43.87 %) 25-34 ปี (27.18 %) 35-44 ปี (13.85 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.4 อื่นๆร้อยละ 2.9 พม่าร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.9 กัมพูชา r้อยละ 0.3 จีน/อ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาเซียนร้อยละ 0.0 ไม่ทราบอาชีพ/ในปักตรองร้อยละ 53.4 รับจำนำร้อยละ 19.6 นักเรียนร้อยละ 14.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1041 ราย), 25-34 ปี (763 ราย), 35-44 ปี (403 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (538 ราย), 25-34 ปี (209 ราย), 35-44 ปี (94 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (373 ราย), 25-34 ปี (175 ราย), 35-44 ปี (85 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (240 ราย), 25-34 ปี (211 ราย), 35-44 ปี (110 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

0

Lumber of Condyloma Acuminata cases by week of onset and region  
2567

