

Condyloma Acuminata

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Condyloma Acuminata พบผู้ป่วย 8551 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 18 พย 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 12.92 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.65 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (43.12 %) 25-34 ปี (28.06 %) 35-44 ปี (13.78 %) สัญชาติเป็นไทย ร้อยละ 94.3 อื่นๆร้อยละ 2.9 พม่าร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.9 กัมพูชาร้อยละ 0.3 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 เวียดนาม ร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 53.8 รับจ้างร้อยละ 19.7 นักเรียนร้อยละ 14.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1736 ราย), 25-34 ปี (1351 ราย), 35-44 ปี (693 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (909 ราย), 25-34 ปี (391 ราย), 35-44 ปี (174 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (630 ราย), 25-34 ปี (299 ราย), 35-44 ปี (131 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (412 ราย), 25-34 ปี (358 ราย), 35-44 ปี (180 ราย),




อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Condyloma Acuminata cases by week of onset and regio

2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health