

Chikungunya

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Chikungunya พบผู้ป่วย 179 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 15 เมย 67 จาก 34 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.27 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.93 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (21.23 %) 35-44 ปี (20.67 %) 25-34 ปี (18.99 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.1 พม่าร้อยละ 1.7 อื่นๆร้อยละ 0.6 กัมพูชาร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.6 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.6 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบ อาชีพในปกครองร้อยละ 57.5 รับจ้างร้อยละ 20.1 นักเรียนร้อยละ 7.8

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (33 ราย), 35-44 ปี (24 ราย), 55-64 ปี (20 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (3 ราย), >65 ปี (2 ราย), 55-64 ปี (2 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (4 ราย), 25-34 ปี (2 ราย), 10-14 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (10 ราย), 35-44 ปี (9 ราย), 15-24 ปี (7 ราย),



This plugin is not supported

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Chikungunya cases by week of onset and region.
2567

