

## Chikungunya

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Chikungunya พบผู้ป่วย 194 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 19 เมย 67 จาก 34 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.29 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.90 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 35-44 ปี (22.16 %) 45-54 ปี (21.65 %) 25-34 ปี (18.04 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.4 พม่าร้อยละ 2.1 อื่นๆร้อยละ 1.0 กัมพูชาร้อยละ 0.5 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.5 ลาวร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบ อาชีพในปกครองร้อยละ 58.2 รับจ้างร้อยละ 19.6 นักเรียนร้อยละ 8.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (36 ราย), 35-44 ปี (30 ราย), 55-64 ปี (20 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (4 ราย), 55-64 ปี (2 ราย), >65 ปี (2 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (4 ราย), 25-34 ปี (2 ราย), 10-14 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (10 ราย), 35-44 ปี (9 ราย), 15-24 ปี (8 ราย),



This plugin is not supported

อัตราต่อแสนประชากร

0

Number of Chikungunya cases by week of onset and region.  
2567

