

## Chikungunya

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Chikungunya พบผู้ป่วย 250 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 22 มิย 67 จาก 43 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.38 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.53 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 35-44 ปี (21.20 %) 45-54 ปี (20.40 %) 25-34 ปี (18.40 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.6 อื่นๆ ร้อยละ 1.6 พม่าร้อยละ 1.6 กัมพูชาร้อยละ 0.4 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 58.0 รับจ้างร้อยละ 21.2 นักเรียนร้อยละ 6.8

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (39 ราย), 35-44 ปี (32 ราย), 55-64 ปี (25 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (10 ราย), 25-34 ปี (6 ราย), 15-24 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (8 ราย), 45-54 ปี (4 ราย), 25-34 ปี (3 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (15 ราย), 35-44 ปี (11 ราย), 15-24 ปี (10 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Chikungunya cases by week of onset and region.  
2567

