

# Chikungunya

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Chikungunya พบผู้ป่วย 280 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 19 กค 67 จาก 45 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.42 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.59 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 35-44 ปี (22.50 %) 45-54 ปี (22.14 %) 25-34 ปี (17.50 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.1 อื่นๆ ร้อยละ 1.4 พม่าร้อยละ 1.4 กัมพูชาร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.4 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 52.9 รับจ้างร้อยละ 22.5 นักเรียนร้อยละ 7.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (43 ราย), 35-44 ปี (32 ราย), 55-64 ปี (24 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (11 ราย), 55-64 ปี (10 ราย), 25-34 ปี (8 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (13 ราย), 25-34 ปี (5 ราย), 10-14 ปี (4 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (15 ราย), 35-44 ปี (12 ราย), 15-24 ปี (10 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Chikungunya cases by week of onset and region.  
2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health