

Chikungunya

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Chikungunya พบผู้ป่วย 630 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 17 พย 67 จาก 55 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.95 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.52 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (20.79 %) 35-44 ปี (19.21 %) 25-34 ปี (16.98 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.0 อื่นๆ ร้อยละ 1.6 พม่าร้อยละ 0.8 ลาวร้อยละ 0.3 กัมพูชาร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 47.8 รับจ้างร้อยละ 21.3 นักเรียนร้อยละ 10.8

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (62 ราย), 35-44 ปี (50 ราย), 25-34 ปี (37 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (47 ราย), 25-34 ปี (40 ราย), 55-64 ปี (37 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (30 ราย), 45-54 ปี (15 ราย), >65 ปี (14 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (21 ราย), 35-44 ปี (16 ราย), 15-24 ปี (13 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

0

Number of Chikungunya cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health