

Chikungunya

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Chikungunya พบผู้ป่วย 661 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 29 พย 67 จาก 57 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.00 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.54 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (20.27 %) 35-44 ปี (19.21 %) 25-34 ปี (17.55 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.3 อื่นๆ ร้อยละ 1.4 พม่าร้อยละ 0.8 ลาว.r้อยละ 0.3 กัมพูชา.r้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ ในประกอบร้อยละ 47.0 รับจำ>r้อยละ 21.2 นักเรียนร้อยละ 11.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (63 ราย), 35-44 ปี (52 ราย), 25-34 ปี (39 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (49 ราย), 25-34 ปี (45 ราย), 55-64 ปี (37 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (32 ราย), >65 ปี (16 ราย), 45-54 ปี (15 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (22 ราย), 35-44 ปี (16 ราย), 15-24 ปี (14 ราย),




ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

0

Number of Chikungunya cases by week of onset and region.

2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health