

Zika virus

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Zika virus พบผู้ป่วย 143 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 15 มิย 67 จาก 26 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.22 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.55 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (26.57 %) 35-44 ปี (25.17 %) 45-54 ปี (15.38 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 79.0 อื่นๆร้อยละ 19.6 พม่าร้อยละ 1.4 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 78.3 รับจ้างร้อยละ 9.8 เกษตรร้อยละ 4.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (21 ราย), 35-44 ปี (21 ราย), 45-54 ปี (18 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (3 ราย), 35-44 ปี (1 ราย), 0-27 วัน (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (2 ราย), 45-54 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (14 ราย), 35-44 ปี (12 ราย), 55-64 ปี (4 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Zika virus cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health