

Zika virus

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Zika virus พบผู้ป่วย 139 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 16 กค 67 จาก 28 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.21 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.40 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (25.18 %) 35-44 ปี (25.18 %) 45-54 ปี (15.11 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 79.9 อื่นๆร้อยละ 18.7 พม่าร้อยละ 0.7 ลาวร้อยละ 0.7 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 76.3 รับจ้างร้อยละ 10.1 นักเรียนร้อยละ 5.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (18 ราย), 45-54 ปี (16 ราย), 35-44 ปี (16 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (3 ราย), 0-27 วัน (1 ราย), 35-44 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (5 ราย), 55-64 ปี (3 ราย), 45-54 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (13 ราย), 25-34 ปี (13 ราย), 55-64 ปี (4 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Zika virus cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health