

Zika virus

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Zika virus พบผู้ป่วย 383 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 13 พย 67 จาก 44 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.58 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.38 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 35-44 ปี (24.54 %) 25-34 ปี (23.50 %) 45-54 ปี (15.14 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 88.5 อื่นๆร้อยละ 9.7 พม่าร้อยละ 0.5 ลาวร้อยละ 0.5 กัมพูชาร้อยละ 0.5 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 67.4 รับจ้างร้อยละ 11.0 นักเรียนร้อยละ 10.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (48 ราย), 25-34 ปี (39 ราย), 45-54 ปี (38 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (20 ราย), 25-34 ปี (17 ราย), 45-54 ปี (10 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (17 ราย), 35-44 ปี (13 ราย), 55-64 ปี (10 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (17 ราย), 35-44 ปี (13 ราย), 55-64 ปี (7 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□0

Number of Zika virus cases by week of onset and region.
2567

